



## 四硫磺酸盐煌绿增菌液基础（TTB）使用说明书

**【货号】** CP203A

**【用途】**

用于药品中沙门氏菌选择性增菌培养。（药典）

**【规格】** 250g/瓶

**【成分】 (g/L)**

胨	5.0
牛胆盐	1.0
碳酸钙	10.0
硫代硫酸铵	30.0

**附加试剂：**

碘溶液（碘 0.2 g/mL；碘化钾 0.25g/mL） 20mL/L

0.1%煌绿 10mL/L

**【pH 值】**

无要求

**【原理】**

胨在培养基中作为营养物质提供菌体细胞生长所需要的氮源、碳源及生长因子等；CaCO<sub>3</sub>中和吸收有毒性的代谢物质(主要是培养基酸碱度的变化对菌生长的影响)；胆盐抑制革兰氏阳性(G+)菌生长；Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>经I<sub>2</sub>氧化生成四硫磺酸钠对大肠菌群有抑制作用；沙门氏菌具有产四硫磺酸酶的特性能分解四硫磺酸，因而在能该培养基中生长而增殖。

**【用法】**

称取 4.6g 于 100mL 纯化水中，加热煮沸灭菌，冷却，临用前无菌加入 P-72 碘液 1 支(2mL)和 P-73 0.1% 煌绿 1 支 (1mL)，混匀，现用现配。勿需高压灭菌。

注：1、添加附加试剂需要培养基基础冷却至 50°C 以下。添加后充分摇匀。

2、培养基含有不溶解碳酸钙，底层有白色沉淀。分装时需要边摇匀边分装。

**【质量控制】**

质控菌株	方法	培养条件	质控结果
乙型副伤寒沙门氏菌 CMCC(B) 50094	适用性	30°C-35°C 18h-24h	生长良好
金黄色葡萄球菌 CMCC(B) 26003			不生长

**【保存】**

干粉培养基密封保存于 2-25°C 干燥处。

**【产品资料下载】**

质检报告和化学品安全技术说明书（MSDS）可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>，在“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。